

Esmya® 5 mg tabletės / tabletes / tabletid

Pacientės kortelė / Pacienta karte / Patsiendikaart

LT

Esmya gali sukelti nepageidaujamą poveikį, nors jis pasireiškia ne visoms pacientėms. Vienas iš galimų nepageidaujamo poveikio reiškinių yra sunkus kepenų pažeidimas.

Šioje kortelėje pateikiama informacija apie kraujo tyrimus, kuriuos Jums reikės atlikti per gydymo laikotarpį, taip pat nurodoma, ką reikia daryti, pasireiškus nepageidaujamam poveikiui kepenims.

Nevartokite Esmya, jei patiriate kepenų sutrikimų.

Jei žinote, kad Jūsų kepenų veikla sutrikusi, arba dėl savo kepenų būklės nesate tikra, pasitarkite su gydytoju.

Reguliariai atlikite kraujo tyrimus

Prieš pradėdant kiekvieną gydymo kursą reikia atlikti kraujo tyrimus ir įvertinti kepenų veiklą. Atsižvelgdamas į šių tyrimų rezultatus gydytojas nuspręs, ar Jums tinka gydymas Esmya.

Esmya vartojimo laikotarpiu gydytojas Jums reguliariai atliks kraujo tyrimus, kad įvertintų Jūsų kepenų funkciją. Šiuos tyrimus reikia atlikti kiekvieną mėnesį ir praėjus kelioms savaitėms po gydymo pabaigos (žr. toliau pateiktą grafiką). Šie kraujo tyrimai gydytojui suteiks informacijos apie Jūsų kepenų funkciją ir yra nepaprastai svarbūs stebint Jūsų gydymą.

	DATA
1-asis TYRIMAS (prieš pradėdant gydyti)	
Gydymo pradžia	
2-asis TYRIMAS (praėjus 4 savaitėms nuo gydymo pradžios)	
3-iasis TYRIMAS (praėjus 8 savaitėms nuo gydymo pradžios)	
4-asis TYRIMAS (praėjus 12 savaitėms nuo gydymo pradžios)	
5-asis TYRIMAS (praėjus 2–4 savaitėms po Esmya vartojimo pabaigos)	

Jei pastebėtumėte toliau išvardytų požymių ar simptomų, nutraukite vaisto vartojimą ir nedelsdama kreipkitės į gydytoją:

- pavargimas, didelis nuovargis
- odos ir (arba) akių pageltimas
- patamsėjęs šlapimas
- skausmas dešinėje viršutinėje pilvo dalyje
- niežėjimas
- pykinimas
- vėmimas.

Gydytojas turi nedelsdamas patikrinti Jūsų kepenų būklę ir nuspręsti, ar galite tęsti gydymą.

LV

Esmya var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Viena no iespējamām blakusparādībām ir smags aknu bojājums.

Šajā kartē ir sniegta informācija par asins analīzēm, kuras Jums būs nepieciešams veikt ārstēšanas laikā, un par to, ko darīt, ja rodas aknu blakusparādības.

Nelietojiet Esmya, ja Jums ir aknu darbības traucējumi.

Pastāstiet savam ārstam, ja zināt, ka Jums ir aknu darbības traucējumi, vai ja šaubāties par savu aknu stāvokli.

Regulāri veikt asinsanalīzes

Pirms katra ārstēšanas kursa uzsākšanas Jums ir nepieciešams veikt asinsanalīzes, lai uzzinātu, kā darbojas Jūsu aknas. Atkarībā no šo pārbažu rezultātiem ārsts izlems, vai ārstēšana ar Esmya Jums ir piemērota.

Kā turite žinoti prieš pradėdama vartoti vaisto?

Kā reikia padaryti prieš pradėdant gydyti, per gydymo laikotarpį ir pabaigus gydymą?

Toliau pateikiama lentelė padės jums suprasti, kada reikia atlikti kraujo tyrimus:

Galimų kepenų sutrikimų požymiai ir simptomai

Kas jums jāzina pirms lietošanas?

Ko darīt pirms ārstēšanas, tās laikā un pēc tās?

Turpmāk dotā tabula
palīdzēs jums sekot
līdz jūsu asins
analüüsides:

Iespējama aknu
dabības traucējumu
pazīmes un sümptomid

Mida on vaja
teada enne ravimist
kasutamist?

Mida tuleb teha enne
ravi, ravi ajal ja pärast
ravi?

Allolev tabel aitab teil
vereanalüüsides aegu
meeles pidada:

Võimalike
maksaprobleemide
nähtud ja sümptomid

Esmya ärstēšanas laikā Jūsu ärsts Jums veiks regulāras asinsanalüüzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību. Šīs pārbaudes ir jāveic reizi mēnesī un arī dažas nedēļas pēc ärstēšanas pārtraukšanas (skatīt tabulu turpmāk). Šīs asinsanalüüzes informēs ärstu par Jūsu aknu darbību, un tās ir ļoti svarīgas Jūsu ärstēšanas kontrolē.

	DATUMS
1. PÄRBAUDE (pirms ärstēšanas uzsākšanas)	
Ärstēšanas sākums	
2. PÄRBAUDE (4 nedēļas pēc ärstēšanas sākuma)	
3. PÄRBAUDE (8 nedēļas pēc ärstēšanas sākuma)	
4. PÄRBAUDE (12 nedēļas pēc ärstēšanas sākuma)	
5. PÄRBAUDE (2-4 nedēļas pēc Esmya ärstēšanas pārtraukšanas)	

Pārtrauciet ärstēšanu un nekavējoties sazinieties ar ärstu, ka Jūs novērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm vai sümptomiem.

- Izteikts vājums, nogurums
- Dzeltena āda/acis
- Tumšāka urīna krāsa
- Sāpes vēdera augšējā labajā pusē
- Nieze
- Slikta dūša
- Vemšana.

Ärstam ir nekavējoties jāpārbauda Jūsu aknas un jāizlemj, vai varat turpināt ärstēšanu.

EE

Esmya võib põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üks võimalik kõrvaltoime on raske maksakahjustus.

Sellel kaardil on teave raviga seotud vajalike vereanalüüsides kohta ning selle kohta, mida teil tuleb teha siis, kui tekivad maksaga seotud kõrvaltoimed.

Ärge võtke Esmya't, kui teil on probleeme maksaga. Kui te teate, et teil on probleeme maksaga või kui te pole kindel, kas teie maks on korras, pidage nõu oma arstiga.

Laske regulaarselt vereanalüüse teha

Enne iga ravikuuri alustamist on vaja teha vereanalüüsid, et saada teada, kuidas teie maks töötab. Ärstsustab analüüsides tulemuste järgi, kas ravi Esmya'ga sobib teile.

Ravi ajal Esmyaga teeb ärst teile maksatalitluse kontrollimiseks regulaarselt vereanalüüse. Neid analüüse tuleb teha iga kuu ja ka mõni nädal pärast ravikuuri lõppu (vt ajakava allpool). Nende vereanalüüsides järgi on ärstil võimalik hinnata teie maksatalitlust, seepärast on need teie ravi jälgimise juures väga tähtsad.

	KUUPÄEV
1. ANALÜÜS (enne ravi algust)	
Ravi algus	
2. ANALÜÜS (4 nädalat pärast ravi algust)	
3. ANALÜÜS (8 nädalat pärast ravi algust)	
4. ANALÜÜS (12 nädalat pärast ravi algust)	
5. ANALÜÜS (2...4 nädalat pärast Esmya'ga ravimise lõpetamist)	

Lõpetage ravi ja võtke kohe ühendust arstiga, kui märkate mõnda järgmistest nähtudest või sümptomitest:

- tugev väsimus
- naha/silmade kollasus
- tumenenud uriin
- valu paremal ülakõhus
- sügelus
- iiveldus (süda on paha)
- oksendamise.

Ärsts peab kohe teie maksa kontrollima, et otsustada, kas te võite ravi jätkata.