

DZEMDES KAKLA SKRĪNINGA
IZMEKLĒJUMU ALGORITMI
LATVIJĀ NO 01.07.2022.

CITOĻĪJAS ALGORITMS NO 25-29 GADIEM

Testēšanas rezultāts	Rīcība
Testēšana bez rezultāta	tests jāatkārto pēc 3 mēnešiem
Nav atrasts intraepiteliāls bojājums	jāgaida nākamais uzaicinājums pēc 3 gadiem
ASC-US, AR CPV negatīvs (ASCUS: neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (Atypical Squamous Cells of Unknown Significance))	jāgaida nākamais uzaicinājums pēc 3 gadiem
ASC-US, AR CPV pozitīvs	jāveic kolposkopija
ASC-H (daudzkārtainā plakanā epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas – nevar izslēgt vidēju/smagu displāziju (Atypical Squamous Cells – high grade not excluded))	jāveic kolposkopija
LSIL (viegla displāzija), AR CPV negatīvs	jāgaida nākamais uzaicinājums pēc 3 gadiem
LSIL, AR CPV pozitīvs	jāveic kolposkopija
HSIL (vidēja/smaga displāzija)	jāveic kolposkopija
AGUS, AR CPV negatīvs (AGUS: AGUS: neskaidras nozīmes glandulāra epitēlija šūnu atipiskas izmaiņas (Atypical Glandular cells of Unknown Significance))	jāgaida nākamais uzaicinājums pēc 3 gadiem (!!! ja patoloģiska dzemdes asiņošana – veikt atbilstošos izmeklējumus – USG, endometrija biopsija)
AGUS, AR CPV pozitīvs	jāveic kolposkopija
Malignizācijas pazīmes	konsultācija pie onkoginekologa

PRIMĀRĀ CPV SKRĪNINGA ALGORITMS NO 30-70 GADIEM

